



INFORMACION PARA PACIENTES EN RADIOTERAPIA: TESTÍCULOS

La información aquí contenida está designada a conocer en qué consiste el tratamiento que va a recibir y los efectos secundarios más comunes derivados del mismo. Los médicos y enfermeras del departamento de Radioterapia le darán información adicional. Por favor haga las preguntas que necesite.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DURANTE LA RADIOTERAPIA

- ◆ Para evitar la irritación de la piel, use calzoncillos de algodón que le queden sueltos (estilo boxeador).
- ◆ Si notara náuseas, vómitos, diarrea o mayor frecuencia para orinar, avise a su médico o enfermera. Estos síntomas pueden controlarse con medicamentos.
- ◆ Si se encuentra cómo, puede continuar con su actividad sexual durante el transcurso de la radioterapia; sin embargo, debe tomar precauciones para evitar un embarazo durante el tratamiento y por lo menos un año después de completar el mismo.

INSTRUCCIONES DESPUÉS DE LA RADIOTERAPIA

- ◆ Continúe con la medicación recetada para las náuseas, vómitos y/o diarrea. Si estos síntomas continúan más de dos o tres semanas después de completar su terapia, avise a su médico.
- ◆ Se exigen las visitas de control durante los 2 ó 3 años siguientes. Asegúrese de presentarse a todas las visitas.
- ◆ Por lo menos una vez al mes examínese el escroto y los testículos.